



ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်(၂) သင်တန်း
(၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်

နှလုံးနှင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်း(PEN Approach)

၇။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါနှင့် နာတာရှည်လေဖြန်ကျဉ်းရောဂါ
ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုသခြင်း (၂) နာရီ



- ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ(Asthma)
- နာတာရှည်လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ(Chronic Obstructive Pulmonary Disease–COPD)



ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါနှင့် နာတာရှည် လေဖြန် ကျဉ်းရောဂါ ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုသခြင်း

(က) စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း

- ချောင်းဆိုးခြင်း
- ရင်တွင်း၌ တင်းကြပ်စွာခံစားခြင်း
- အသက်ရှူမဝခြင်း
- မောပန်းခြင်း
- အသက်ရှူသွင်း
- ရှူထုတ်လိုက်စဉ် အသံတစ်ခွီခွီမြည်ခြင်း



(ခ) ရောဂါခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

Asthma	COPD
<p>(၁) ယခင်ကတည်းက ပန်းနာရင်ကြပ်ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း။</p> <p>(၂) ကလေးဘဝနှင့် ပျို့ရွယ်စဉ်ကပင် ရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်ခဲ့ခြင်း။</p> <p>(၃) Hay fever ၊ နှင်းခူနှင့် ဓါတ် (အစားအသောက်) မတည့်သောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ယားယံ အဖုအပိန့်ထွက်ခြင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရာဇဝင်ရှိခြင်း။</p> <p>(၄) ရောဂါလက္ခဏာမပေါ်သော အချိန် ကာလ ရှိခြင်း၊ ညနှင့် မနက်စောစော၌ ရောဂါလက္ခဏာ ပိုမိုဆိုးဝါးလာခြင်း၊ အဆုတ် လမ်းကြောင်း အတွင်းသို့ ပိုးဝင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ရာသီအကူးအပြောင်းနှင့် သောကများခြင်းကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာ ပေါ်လာနိုင်သည်။</p> <p>(၅) Sulbutamol ကြောင့် ရောဂါ သက်သာ ခြင်း</p>	<p>(၁) ဆေးလိပ်ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲများစွာ သောက်ရှူ ခြင်း (တစ်နေ့လျှင် စီးကရက် အလိပ် ၂၀ ထက်ပိုပြီး (၁၅)နှစ်ကျော် သောက်သူ)။</p> <p>(၂) ပိတ်လှောင်နေသောနေရာ၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဧရိယာ တွင် မီးခိုးငွေ့၊ ဖုန်မှုန့်အမြောက်အမြားနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိတွေ့နေရသူများ။</p> <p>(၃) လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွင်ရောဂါလက္ခဏာများ စတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) နောက်ပိုင်း (ပုံမှန် အားဖြင့် အသက်၄၀ကျော်) နှစ်ရှည်ကြာလာ သည်နှင့် အမျှ ရောဂါလက္ခဏာပိုမိုဆိုးဝါးလာခြင်း၊ အသက်ရှူမဝ ခြင်း မဖြစ်ခင်ရောဂါလက္ခဏာ စတင်ဖြစ်ပွားခြင်း။ ရောဂါ လက္ခဏာသည် တစ်နေ့နှင့်တစ်နေ့အနည်းငယ် ကွဲပြား မှုသာ ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။</p>



(ဂ) ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း

- ရှေးဦးစွာ အပြင်းဆုံးရှူထုတ်နိုင်သော လေအား Peak Expiratory flow rate (PEFR) ကို တိုင်းတာ၍ မှတ်သားရမည်။
- ၎င်းနောက် Sulbutamol ဆေးနှစ်ခါရှူသွင်းစေပြီး ၁၅-မိနစ်အကြာတွင် နောက်ထပ် တစ်ကြိမ် (PEFR) တိုင်းကြည့်ပါ။
- ယခင်တိုင်းခြင်းရလဒ်ထက် ၂၀% ပိုလာပါက "ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ" ဟု သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
- ရလဒ်ပြောင်းလဲမှုမရှိ (သို့) အနည်းငယ် သာပိုပါက "နာတာရှည်အဆုတ်လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ" ဟု သတ်မှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။



Peak Flow Meter



Inhaler



Spacer



ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါသက်သာအောင် ထိန်းထားနိုင်သည့် လူနာ၏ လက္ခဏာများ

- ရောဂါလက္ခဏာမှာ နေ့ပိုင်းတွင်သာပေါ်ပြီး ဆေးကိုတစ်ပတ်လျှင် ၂-ကြိမ်(သို့မဟုတ်) အကြိမ်အနည်းငယ်ပေါ်ပြီး လေပြွန်ချဲ့ဆေး၊ ရှူဆေးကို သုံးစွဲရခြင်း။
- ရောဂါလက္ခဏာများ ညပိုင်းတွင်သာ မဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
- နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အနည်းငယ်သာ အခက်အခဲရှိခြင်း။
- တစ်လအတွင်း ပြင်းထန်သောပန်းနာရောဂါ ထမှုမရှိခြင်း။ (Steroid ဆေးမသောက်ရခြင်း၊ ဆေးရုံမတက်ရခြင်း။)
- PEFR တိုင်းကြည့်နိုင်ပါက တိုင်းကြည့်ရန် (၈၀%အထက်ရှိမည်)။
- ယင်းလက္ခဏာတစ်ရပ်ရပ်မှ လွဲချော်နေပါက ရောဂါကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိဟု မှတ်ယူရမည်။



ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါကုသခြင်း

တဆင့်ပြီးတဆင့်ထိန်းချုပ်သောနည်းဖြင့်

ပန်းနာရင်ကြပ်ကုသမှုကို

လိုအပ်သလို အတိုးအလျှော့လုပ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်။



ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါကုသခြင်း

- အဆင့်(၁) Sulbutamol ရှူဆေးကို လိုအပ်က ရှူခြင်း။
- အဆင့်(၂) Sulbutamol ရှူဆေးကို လိုအပ်ကရှူခြင်းနှင့်တွဲ၍ လူကြီးဖြစ်ပါက Budesonide ရှူဆေး 100 μ g တစ်နေ့တစ်ကြိမ် (သို့မဟုတ်) နှစ်ကြိမ်ရှူခြင်း။
- အဆင့်(၃) အဆင့်(၂)အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးပမာဏကို မြင့်၍ Budesonide 200 μ g or 400 μ g တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ရှူခြင်း။
- အဆင့်(၄) အဆင့်(၃)အပြင် Theophylline ဆေးကိုပါ တိုက်ကျွေးခြင်း။



ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါကုသခြင်း

အဆင့်(၅) Prednisolone ဆေးတိုက်ကျွေးခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာသက်သာခြင်း
အနည်းဆုံး ဆေးအချိန်အဆဖြင့်သာ တိုက်ကျွေးရန် (နေ့စဉ် 10 mg
ထက် အမြဲတမ်းနည်းရန်)

- အဆင့်တိုင်း၌ လူနာသည် ကုသမှုကို ရေရှည်စွဲစွဲမြဲမြဲခံယူခြင်းရှိ/မရှိနှင့်
- ဆေးရှူသည့် နည်းလမ်းများကို ပုံမှန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရမည်။
- အဆင့်(၃) အထိသာ အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး
ကျန်အဆင့်ရောက်ပါက တိုက်နယ်/မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ လူနာလွှဲပြောင်းပေးရန်။



ညွှန်းပို့ပေးခြင်း

- (၁) ပန်းနာရင်ကြပ်မထအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို ပုံမှန် ၃-လမှ ၆လ အကြာအတွင်း ပြန်စိစစ်ရန်၊
- (၂) ကုသမှုအဆင့် မကြာခဏ ပြောင်းလဲနေခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်ရပါက မကြာခဏ ပြန်စိစစ်ရန်။



အထူးကုဆရာဝန်ထံ ညွှန်းပို့ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များ

- ပန်းနာရင်ကြပ်ကို သက်သာအောင် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိခြင်း
- ပန်းနာရင်ကြပ်ဟု ရောဂါသတ်မှတ်ချက် မသေချာခြင်း
- ရောဂါသက်သာရန် Prednisolone ဆေးလိုအပ်ခြင်း



အကြံပေးခြင်း

ပန်းနာရင်ကြပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လူနာနှင့်မိသားစုအား အကြံပြုရန်အချက်များ

- (၁) ပန်းနာရင်ကြပ်မဖြစ်အောင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ပန်းနာရင်ကြပ်ထစေသောအချက်များကို ရှောင်ရန်။
- (၂) ဖုန်မှုန့်နှင့်မီးခိုးများပြည့်နေသော အခန်းများ၌ မနေရန်။
- (၃) ပန်းနာရင်ကြပ်ထစေသောပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့နေသည့် အလုပ်များကို ရှောင်ရန်၊ ပရိဘောဂများ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ အခန်းကြမ်းခင်းများကို ရေဖြန်းခြင်း၊ ပန်ကာဒလက်များ ဖုန်သုတ်ခြင်း၊ အိပ်ခန်းအတွင်း ကလေးကစားစရာများ ထားရှိခြင်း၊ မတည့်သော ပစ္စည်းများထားခြင်း၊ အိပ်ယာခင်းများကို ခါခြင်း၊ နေလှန်းခြင်း၊ အိမ်တွင်း ပိုးဟပ်များရှိခြင်း စသည်တို့ကို ရှောင်ရှားရန်။



အကြံပေးခြင်း

- (၄) လူနာနှင့်လူနာ၏ မိသားစုများအနေဖြင့် ဆေးကုသရာတွင် ညွှန်ကြားချက်များအား သိရှိရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
- (၅) ရှူဆေးကို အသုံးပြုခြင်းသည် သောက်ဆေးကိုသုံးခြင်းထက် ပိုမိုအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိပြီး လိုအပ်ပါက Spacer အား ဘာကြောင့်အသုံးပြုရခြင်းကိုပါ သိရှိရန်လိုအပ်သည်။
စတီးရွိုက် (Steroid) ရှူဆေးကို ရက်ပေါင်းများစွာ (သို့မဟုတ်) ရက်သတ္တပတ်များစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကို သိရှိစေရန်။




ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ကုသပုံအဆင့်ဆင့်

ရောဂါလက္ခဏာများ

- (က) ချောင်းဆိုးခြင်း
- (ခ) အသက်ရှူကြပ်ခြင်း
- (ဂ) တနှိုးနှိုး အသံထွက်ခြင်း





SABA – Short-Acting Beta-Agonist

ICS – Inhaled corticosteroid



နာတာရှည် အဆုတ်ပွလေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ ရှာဖွေကုသရန် ကုထုံးလမ်းညွှန်

- ၁။ လူနာ၏ အခြေအနေကို သာမန် (သို့မဟုတ်) ပြင်းထန်ခဲ့ခြားတတ်ရန်၊
- ၂။ Sulbutamol ရှူဆေးကို အသုံးပြုတတ်ရန် သင်ကြားပေးရန်၊
- ၃။ စားဆေးပေးရန် Theophylline ပေးဖို့ စဉ်းစားရန် နှင့်
- ၄။ လူနာနှင့် မိသားစု ကို အကြံပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။



ရောဂါပြင်းထန်မှုကိုသုံးသပ်ခြင်း

- သာမန်အခြေအနေအသက်ရှူကြပ်(သို့မဟုတ်) အသက်ရှူမဝသော်လည်း ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ ကို လုပ်နိုင်သည်။
- ပြင်းထန်သောအခြေအနေ - အနားယူသည့်အချိန်၌ပင် အသက်ရှူကြပ်(သို့မဟုတ်) အသက်ရှူမဝခြင်း။
- တတ်နိုင်ပါက PEFR နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာတွင် အောက်ဆီဂျင်ပြည့်ဝမှု (SPO2) တိုင်းရန်။



ကုသခြင်း

- Sulbutamol ရှူဆေးကို လိုအပ်ပါက တစ်ကြိမ်လျှင် ၂-ခါ ရှူသွင်းရှူထုတ်ခြင်း တစ်နေ့လျှင် ၄-ကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ရှူဆေးသုံးပြီးသော်လည်း မသက်သာပါက စားဆေး Theophylline သုံးရန် စဉ်းစားပါ။
- Ipratopium inhaler ကို Sulbutamol အစားသုံးခြင်း၊ ထပ်ဖြည့်သုံးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ (ဈေးကြီးပါသည်။)



ညွှန်းပို့ပေးခြင်း

- (၁) ရောဂါလက္ခဏာများ မသက်သာသော လူနာများ
- (၂) ရောဂါပြင်းထန်သော လူနာများ
- (၃) ရောဂါကြွနေသော လူနာများ
- (၄) အခြားရောဂါများနှင့် တွဲနေသော လူနာများ (နှလုံးရောဂါနှင့် အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ)



လူနာနှင့်မိသားစုကိုအကြံပြုရန်

- ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အိမ်တွင်လေထုညစ်ညမ်းခြင်းသည် နာတာရှည်အဆုတ်ပွ လေဖြွန်ကျဉ်း ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။
- ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖိုမုန့်နှင့်ဆေးလိပ်ငွေ့များကို လူနာမှ မရှူမိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမည်။
- မီးဖိုချောင်လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထားရန် လိုပါသည်။
- ထင်း၊ မီးသွေးအသုံးပြုပါက မီးဖိုချောင်ကို အိမ်အပြင်၌ထားခြင်း၊ မီးခိုးအပြင်ထွက်ရန် မီးခိုး ခေါင်းတိုင်တပ်ခြင်း၊ လေစုပ်ပန်ကာတပ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှထွက်သည့်အမှုန်များ ရှိခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းခြင်းရှိသည့်နေရာများ၌ နှာခေါင်းစည်းများသုံးခြင်း၊ လေထုမညစ်ညမ်း အောင် ပုံစံထုတ်ဆောက်လုပ်ထားသည့် နေရာများ၌ အလုပ်လုပ်ရန်လိုပါသည်။



နာတာရှည်အဆုတ်ပွ လေဖြူနံကျဉ်းရောဂါ ကုသပုံအဆင့်ဆင့်

ရောဂါလက္ခဏာများ

- (၁) ချောင်းဆိုးခြင်း
- (၂) သလိပ်ထွက်ခြင်း
- (၃) မောခြင်း/အသက်ရှူကြပ်ခြင်း

ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အကြောင်းအရာများဖြင့် ထိတွေ့ခြင်း

- (၁) ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
- (၂) အလုပ်အကိုင်
- (၃) အိမ်တွင်းနှင့် အိမ်ပြင်ပ လေထုညစ်ညမ်းခြင်း



အကယ်၍ လက်ကား (တ) သို့ (ခ) သို့ (ဂ) နှင့် ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အကြောင်းအရာများရှိပါက $(-)$ ဆရာဝန်ပုဂ္ဂိုလ်



အကယ်၍ နာတာရှည် အဆုတ်ပွလေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ နှင့် တူပါက



ရင်းဘက်ခံစားမှုများရှိပြီး ဖြစ်ပွားရခြင်းများအား ဖယ်ထုတ်ရန် (ဥပမာ-တီဘီရောဂါ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ နှင့် အဆုတ်ဖိုးဝင်ခြင်း)

ဆင်တူရိုးများရောဂါများအား ဖယ်ထုတ်ပေးပါက



အခြေခံတုံ့ထုတ်ပေးရမည့်ဆေးဝါးများ	
ဆေးဝါးများဖြင့် ကုသခြင်း	ဆေးဝါးမဟုတ်သော အရာများဖြင့် ကုသခြင်း (မဖြစ်မနေ လုပ်ရမည်)
<p>အဆင့်(၁). Salbutamol</p> <p>အကယ်၍ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက</p> <p>အဆင့်(၂). Ipratropium bromide or ICS + LABA</p> <p>အကယ်၍ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက</p> <p>အဆင့်(၃). ICS + LABA + Theophylline or Ipratropium bromide</p> <p>အကယ်၍ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါက</p> <p>အဆင့်(၄). ICS + LABA + Theophylline + Ipratropium bromide</p>	<ul style="list-style-type: none"> ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ရှောင်ရန် ဖြစ်ပွားစေနိုင်သော အကြောင်းအရာများ ရှောင်ကြဉ်ရန် တုတ်ခဲကွဲရောဂါက ကွယ်ဆေးထိုးရန်

ICS – Inhaled corticosteroid

LABA – Long-Acting Beta-Agonist



မကူးစက်ရောဂါများကို ပူးပေါင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကြပါစို့။



ကျေးဇူးတင်ပါတယ်