



ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်(၂) သင်တန်း
(၂၀၂၀)ပြည့်နှစ်

နှလုံးနှင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်း(PEN Approach)

(၄-၁-၅) ဆောင်ရွက်ရန် (၅) ရောဂါကုသမှုပေးခြင်း
သွေးတိုးရောဂါ (Hypertension)

(၁) နာရီ



သွေးတိုးရောဂါ (Hypertension)

သွေးတိုးရောဂါဟု သတ်မှတ်နိုင်သော အခြေအနေ (Diagnosing Hypertension)

- သွေးပေါင်ချိန် **၁၄၀/၉၀ mmHg နှင့်အထက်** - ၅ မိနစ် ခြားနား၍ သွေးပေါင်ချိန် နှစ်ခါတိုင်းရန်။
- သွေးပေါင်ချိန် **၁၆၀/၁၀၀ mmHg နှင့်အထက်** - ချက်ချင်း ဆေးကုသရန်။

မှတ်ချက် ။ သွေးပေါင်ချိန် ၁၃၀-၁၃၉/၈၀-၈၉ mmHg နှင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရာခိုင်နှုန်း နည်းသူများသည် သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ လိုက်နာသင့်သော ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အပြုအမူအနေအထိုင်များကို လိုက်နာရန်။



သွေးတိုးရောဂါ ကုသမှုခံယူနေသူ၏ ရှိသင့်သော သွေးပေါင်ချိန် (Target Blood Pressure)

1. သွေးပေါင်ချိန် **၁၄၀/၉၀ mmHg** အောက်သို့ သွေးပေါင် ထိန်းထားရန်။
2. ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါရှိသူနှင့်
နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်းများသူများ (၂၀% နှင့်အထက်) တွင်
သွေးပေါင်ချိန် **၁၃၀/၈၀ mmHg** အောက်သို့ သွေးပေါင် ထိန်းထားရန်။



Amlodipine (Calcium Channel Blocker-CCB) အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များ

- မည်သည့် လူမျိုးတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။
- ကျောက်ကပ်နှင့် ဆားဓါတ် အခြေအနေများကို ပုံမှန် စစ်ဆေးနေရန် မလိုအပ်ပါ။
- အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် ကာလအတွင်း ဆေးပြောင်းရန် မလိုအပ်ပါ။



Amlodipine (Calcium Channel Blocker-CCB) အသုံးပြုခြင်း၏ အားနည်းချက်များ

- ဆီးဆေးများထက် ဈေးကြီးပါသည်။
- ဆေးသောက်နေသော လူနာ (၁၀%) တွင် ခြေထောက် ရောင်ရမ်းတတ်ပါသည်။ (အထူးသဖြင့် CCB သွေးပေါင်ကျဆေးတစ်မျိုးတည်းအား အများဆုံး ပေးနိုင်သည့် ပမာဏ ပေးထားလျှင်)



Ramipril (Agiotensin Converting Enzyme Inhibitor-ACEI) *or* Losartan (Angiotensin Receptor Blocker-ARB) အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်

- နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဖူးသူများနှင့် နှလုံးညှစ်အား နည်းသူများနှင့် ဦးနှောက်လေဖြတ်ဖူးသူများတွင် ပို၍ အကျိုးရှိပါသည်



Ramipril (Agiotensin Converting Enzyme Inhibitor-ACEI) *or* Losartan (Angiotensin Receptor Blocker-ARB) အသုံးပြုခြင်း၏ အားနည်းချက်များ

- အခြားသော သွေးပေါင်ကျဆေးများထက် ဈေးကြီး
- Ramipril (ACEI) သောက်သုံးသောလူနာ (၁၀၀%) တွင် ချောင်းဆိုးနိုင်
- Allergy ကဲ့သို့ (ဥပမာ - မျက်လုံးနှင့် နှုတ်ခမ်း) ရောင်ရမ်းခြင်း လူအနည်းစုတွင် ဖြစ်နိုင်ပါသည် (Losartan (ARB) သောက်သူများတွင် မဖြစ်ပါ။)
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သောက်သုံး၍ မရပါ
- ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ် များနိုင်ပါသည်။ (အထူးသဖြင့် နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်များ)



သွေးကျဲဆေး (Aspirin) နှင့် သွေးတွင်းအဆီကျဆေး (Atorvastatin) သောက်သင့်သူများ

- နှလုံးသွေးကြောပိတ်ခဲ့ဖူးသူများ
 - လေဖြတ်ခဲ့ဖူးသူများ
 - ဆီးချို သွေးချိုရှိသူများ
 - နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရာခိုင်နှုန်း မြင့်သူများ (၁၀% နှင့်အထက်)
- *** သွေးကျဲဆေး (Aspirin 75) မစမီ သွေးပေါင်ချိန် ၁၄၀/၉၀ mmHg အောက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။*



သွေးကျဲဆေး (Aspirin) နှင့် သွေးတွင်းအဆီကျဆေး (Atorvastatin) သောက်သင့်သူများ

** ဆီးချိုရောဂါရှိသူများနှင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်း ၁၀% -၂၀% ကြားရှိသူများတွင် **Aspirin ၇၅ mg** နှင့် **Atorvastatin ၁၀ mg** ထပ်ထည့်ရန်

** နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဖူးသူများ၊ လေဖြတ်ဖူးသူများနှင့် နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ % နှင့်အထက်ရှိသူများတွင် **Atorvastatin ၂၀ mg** ထပ်ထည့်ရန်

*** ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် **Atorvastatin** သောက်သုံး၍ မရပါ။



ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းသင့်သည့် အခြေအနေများ -

- သွေးတိုးရောဂါကုသပုံတွင် ပြုထားသော ဆေးများကို သောက်သုံးနေသော်လည်း သတ်မှတ်သွေးပေါင်ချိန် မရောက်ရှိသူများ။
- အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်လာလျှင် (လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးအမော ဖောက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းခြင်း၊ ဖောရောင်ခြင်း)
- ဆေးဝါးများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပြင်းထန်လာလျှင် (ဥပမာ - ဖောရောင်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း)



ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းသင့်သည့် အခြေအနေများ -

- အကယ်၍ သွေးပေါင်ချိန်သည် တိုက်နယ်ဆရာဝန်/သမားတော်မှ ပေးထားသော အခြား သွေးပေါင်ကျဆေး တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ထိန်းနိုင်နေလျှင် သွေးပေါင်ကျဆေး ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ပါ။
- အကယ်၍ လူနာသည် မတ်တပ်ရပ်နေစဉ် မိုက်ခနဲ ခံစားရလျှင် မတ်တပ်ရပ်လျက် သွေးပေါင်ချိန်ရန်နှင့် အပေါ်သွေးပေါင်ချိန်သည် ၁၁၀ mmHg အောက် အမြဲရှိနေလျှင် ဆေးပမာဏ သို့မဟုတ် ဆေးအမျိုးအစား တစ်မျိုးမျိုးကို လျှော့ရန်။



မကူးစက်ရောဂါများကို ပူးပေါင်းကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကြပါစို့။



ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

