

Key Messages for Tobacco

- ၁။ ဆေးလိပ်မီးခိုးငွေတွင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတတ်သော ဓါတ်ပစ္စည်း (၇၀)ကျော် အပါအဝင် ဓါတ်ပစ္စည်းပေါင်း (၇၀၀၀) ကျော် ပါဝင်သည်။
- ၂။ ဆေးလိပ်/ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုကြောင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်ပွားခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မီ သေဆုံးခြင်းကြောင့် မိသားစု၊ လူမှုရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ ရောဂါကုသရခြင်း၊ စောစီးစွာသေဆုံးခြင်းများကြောင့် ဆေးကုသစရိတ်အပါအဝင် မိသားစုစီးပွားရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ ဆုံးရှုံးနစ်နာခြင်း တို့ဖြစ်စေသည်။
- ၃။ ဆေးရွက်ကြီးတွင်ပါဝင်သော နီကိုတင်း၏ စွဲလမ်းစေသောအာနိသင်ကြောင့် ဆေးပေါ့လိပ်၊ ဆေးပြင်းလိပ်၊ စီးကရက်၊ ဆေးရွက်ကြီး တို့ကို စတင်စမ်းသပ် သောက်သုံးကြည့်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း ပို၍ စွဲလမ်းလာပြီး ဆေးလိပ်မသောက်ရ မနေနိုင်အောင်၊ ကွမ်းမစား/ ဆေးမငုံရ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာကြသည်။ အသက်ငယ်စဉ်ကစတင်သောက်သုံးပါက ဖြတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစေပါသည်။
- ၄။ ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏ ဆေးလိပ်ငွေကို ရှူရှိုက်ရခြင်းနှင့် ဆေးပါသော ကွမ်းစားခြင်းတို့ကြောင့် ခံတွင်း ကင်ဆာ၊ လည်ချောင်းကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာနှင့် ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပွားစေပါသည်။
- ၅။ ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏ ဆေးလိပ်ငွေကို ရှူရှိုက်ရခြင်းနှင့် ဆေးပါသော ကွမ်းစားခြင်းတို့ကြောင့် နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း/သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ရုတ်တရက် နှလုံးခုန်ရပ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်သည့် သွေးတိုးရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ပိတ်၍ လေဖြတ်ခြင်း၊ အဆုတ်ပြန်ရောင်ခြင်း (အဆုတ်ပွရောဂါ)၊ ပန်းသေ/ ပန်းညှိုးရောဂါ၊ ခြေပုပ်လက်ပုပ်ရောဂါ (ခြေ၊ လက်ဖြတ်ပစ်ရသည် အထိ ဖြစ်တတ် ပါသည်)
- ၆။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ကိုယ်တိုင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏ ဆေးလိပ်ငွေ ကို ရှူရှိုက်ရခြင်းနှင့် ဆေးပါသော ကွမ်းစားခြင်း တို့ကြောင့် သားပျက်သားလျှောခြင်း (ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း)၊ လမစေ့ ပေါင်မပြည့်သောကလေး မွေးဖွားခြင်း၊ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါချို့ယွင်းချက်ပါလာခြင်း၊ မွေးကင်းစကလေး ရုတ်တရက်သေဆုံးခြင်း၊ ကလေးအသေ မွေးဖွားခြင်း စသည့် ရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေ ပါသည်။

- ၇။ ဆေးလိပ်ငွေကို ရှူရှိုက်ရသော လသားကလေးများ ရုတ်တရက် သေဆုံးခြင်း၊ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များ ရင်ကြပ် ပန်းနာ ဖြစ်ခြင်း၊ နားပြည်ယိုခြင်း ဖြစ်စေသည်။
- ၈။ ဆေးလိပ်ငွေကင်းစင်သည့် လေကောင်းလေသန့်ကို ရှူရှိုက်နိုင်ရန် လူတိုင်းတွင် မွေးရာပါအခွင့်အရေးရှိသဖြင့် သင့်မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ များရှေ့နှင့် လူအများနှင့် ဆိုင်သောနေရာများတွင် ဆေးလိပ်လုံးဝမသောက်ပါနှင့်
- ၉။ ဆေးလိပ်ငွေသည် သောက်သုံးသူကိုသာမက ရှူရှိုက်ရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော နေရာများနှင့် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထားသောနေရာများအားလုံး (ဥပမာ-ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ အများပြည်သူ ဆိုင်ရာအခန်းများ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ)တွင် ဆေးလိပ်မသောက် သင့်ပါ။ ဥပဒေအရ ပြစ်မှုမြောက်ပါသည်။
- ၁၀။ ကာလကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းသည် သုံးစွဲသူများ၏ ထက်ဝက်နီးပါးကို အရွယ်မတိုင်မီ အသက်ဆုံးရှုံးစေသည်။ အန္တရာယ်ကင်းသော စိတ်ချရသော ဆေးလိပ်၊ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုဟူ၍ မရှိပါ။
- ၁၁။ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးကို အစပြုလျှင် စွဲတတ်ပြီး ဖြတ်ရန် အလွန်ခက်ခဲသောကြောင့် လုံးဝအစမပြုပါနှင့်။ မိဘပြည်သူများက သားသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း အစမပြုမိကြစေရန် ဝိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်ကြပါ။ သတိပေးကြပါ။ ကလေးငယ်များရှေ့တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များအား ဆေးလိပ်မီးညှိခိုင်းခြင်း၊ ဆေးလိပ် ဝယ်ခိုင်းခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- ၁၂။ မိမိအိမ်ကို ဆေးလိပ်ငွေကင်းစင်သည့်အိမ်ဖြစ်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းကို ဖြတ်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ မိသားစုဝင်များနှင့် မိတ်ဆွေများ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်းကို ဖြတ်နိုင် ရန်လည်း တိုက်တွန်း အားပေးကူညီပါ။
- ၁၃။ ဆေးလိပ်အစားထိုးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် E Cigarette ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသည် လူကို စွဲလမ်းစေပြီး၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှင့် အဆုတ်ရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါ အစရှိသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေပါသည်။
- ၁၄။ ဆေးရွက်ကြီးပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် မြေဆီလွှာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း၊ သစ်တော ပြုန်းတီးခြင်း၊ ဆေးလိပ်တိုများကြောင့် သဘာဝရေထု ညစ်ညမ်းခြင်း၊ ရေနေ သတ္တဝါ များ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း

